



# Quick Bayt

Cebo contra moscas

## Indicaciones:

**Quick Bayt** es un cebo gránulado para el control de mosca, en aplicaciones domésticas, en la industria o en instalaciones pecuarias; por ejemplo: casas, restaurantes, hoteles, oficinas, cocinas, hospitales, industrias de alimentos, criaderos de aves, cerdos, establos, lecherías, etc.

**Quick Bayt** actúa por ingestión, al ser ingerido por las moscas se adhiere a los receptores nicotínicos de las células nerviosas receptoras, evitando que la acetilcolinesterasa transmita los impulsos nerviosos a las células nerviosas receptoras, lo que conlleva a un deterioro del sistema nervioso y a la muerte del insecto. La muerte ocurre entre uno y quince minutos después de la ingestión.

## Composición:

Tipo de producto cebo mosquicida gránulado  
 Imidacloprid 0,5 % p/p CAS: 138261-41-3  
 Muscalure 0,1 % p/p CAS: 27519-02-4

## Grupo químico:

Cloronicotínilo

## Formulación:

Gránulos en base azúcar

## Toxicidad:

Toxicidad aguda: DL<sub>50</sub> Oral, Rata > 2.500 mg/Kg  
 DL<sub>50</sub> Cutánea Rata > 2.000 mg/Kg

## Mecanismo de acción:

Interfiere en el sistema nervioso.

## Identificación de riesgos:

No se le conocen riesgos particulares.

## Tratamiento:

En caso de ingestión, auxilio básico.  
 Tratamiento sintomático.

## Modo de empleo:

### Quick Bayt

**Como cebo granulado:** Aplicar pequeñas cantidades de **Quick Bayt** en los puntos frecuentados por las moscas. Humedezca ligeramente el cebo para mejores resultados. Aplique en muchos lugares, evitando los sitios frescos y ventosos, ya que las moscas prefieren los lugares abrigados para descansar. Se puede colocar el cebo directamente sobre las superficies o utilizar pequeños platos desechables como estaciones de cebaje. Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

**Como cebo pintura:** Para preparar la mezcla, agregue **Quick Bayt** en agua tibia, en las cantidades recomendadas y revuelva hasta tener una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla durante quince minutos hasta que se forme una pasta de consistencia adecuada para pintar. Aplique la pasta con brocha a las superficies donde descansan las moscas, evitando las superficies con polvo. Puede también pintarse sobre lienzos de cartón o tela, los cuales se colocarán en las áreas frecuentadas por moscas. Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

Tipo de Tratamientos Recomendados	Técnicas de Aplicación	Equipos Recomendados
Tratamiento de acción inmediata	Cebaje mosquicida	No requiere ningún equipo
	Pintado	Brocha

## Usos y Dosis:

Plagas	Técnicas de Aplicación	Dosis Quick Bayt
Mosca doméstica	Cebaje mosquicida	2 gr x m <sup>2</sup>
	Pintado	50 gr más 40 mL de agua

El cebo es efectivo contra moscas con bocas similares a esponja que se alimentan de azúcar. Ejemplo: *Musca domestica*, *Fannia canicularis*, *Calliphora* spp., *Lucilia* spp.

Utilice **Quick Bayt** como parte del programa de control de moscas. El mejor tiempo para comenzar las aplicaciones es a principios de la temporada.

## Registros:

I.S.P. Chile N° P-259/06

## Presentación:

Cajas de 10 x 350 grs.



Bayer Environmental Science

Carlos Fernández 260 - Comuna San Joaquín  
 Fono: 56-5208289 - Casilla 471-3 Santiago 3 - Chile.  
[www.cienciasambientales.cl](http://www.cienciasambientales.cl)